

Esquema de Vacunación

EMBARAZADAS	MENOS DE 1 AÑO	ENTRE 1 Y 2 AÑOS	NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 4 Y 9 AÑOS	ADOLESCENTES 10 A 19 AÑOS	ADULTOS 20 A 59 AÑOS	A. MAYORES 60 AÑOS Y MÁS
DURANTE LOS PRIMEROS 1000 DÍAS SE APLICAN 9 VACUNAS						
 • Tdpa, después de la semana 20 (en cada embarazo) • Influenza, en cada embarazo • COVID-19, a partir del 2° trimestre Tétanos, Difteria, tosferina, Influenza y COVID-19	 • BCG, 0 meses • Hepatitis B, primeros 7 días • Hexavalente Acelular, 2, 4 y 6 meses • Rotavirus, 2 y 4 meses • Neumococo, 2 y 4 meses • Influenza, 6 y 7 meses, dosis anual Tuberculosis, Hepatitis B, Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, neumonía y meningitis, rotavirus e Influenza.	 • SRP, 1ª dosis a los 12 meses; 2ª dosis a los 18 meses • Neumococo, a los 12 meses • Hexavalente Acelular, a los 18 meses Sarampión, Rubéola, Parotiditis, Neumonía, meningitis, Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Hepatitis B.	 • DPT, a los 4 años • SRP*, a los 6 años • Influenza, dosis anual a los 2, 3 y 4 años • COVID-19, primovacuna / refuerzo Difteria, Tosferina, Tétanos, Sarampión, Rubéola, Parotiditis, Influenza y COVID-19	 • VPH** a niñas y niños • Td, revacunación cada 10 años • Influenza, con factores de riesgo • SR*** • Hepatitis B**** • COVID-19, primovacuna / refuerzo con comorbilidad de riesgo VPH, Tétanos, Difteria, Influenza, Sarampión, Rubéola, Hepatitis B y COVID-19	 • Td, revacunación cada 10 años • Influenza, con factores de riesgo • SR*** • Hepatitis B**** • COVID-19, primovacuna / refuerzo con comorbilidad de riesgo Tétanos, Difteria, Influenza, Sarampión, Rubéola, Hepatitis B y COVID-19	 • Influenza, 60 años y más • Neumococo 13/23 Serotipos, a partir de los 60 años • COVID-19, primovacuna / refuerzo con comorbilidad de riesgo Influenza, Neumonía, meningitis y COVID-19

* La segunda dosis de SRP a los 18 meses aplica solo para las y los niñas(os) que cumplieron 18 meses de edad en 2022.

** Mujeres y hombres adolescentes en 5° año de primaria y de 11 años de edad no escolarizadas(os) / Mujeres cis y trans que viven con VIH, de 11 a 49 años de edad.

*** A partir de los 10 años en quienes no tengan dos dosis de SRP o SR.

**** A partir de los 11 años de edad en quienes no tengan antecedente vacunal de HB (al menos 3 dosis de HP o hexavalente)